

Cahit Arf Matematik Günleri I - 2002

Çıkarma ve Kare Alma Altında Kapalı Sayı Kümeleri

Tanımlar: $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ olarak, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ olarak tanımlanmıştır. $*$, gerçel sayılarda tanımlanmış (toplama, çıkarma, çarpma gibi) ikili bir işlem olsun. A bir gerçel sayılar kümesi ise ve her $a, b \in A$ için, $a * b \in A$ ise, o zaman " A , $*$ altında kapalı" denir. Eğer her $a \in A$ için, $a^2 \in A$ ise " A kare alma altında kapalı" denir. Eğer A 'nın her $a \neq 0$ sayısı için, $a^{-1} \in A$ daysa, A kümesine "*tersini alma altında kapalı*" denir.

Aşağıdaki teoremi (kanıtlamadan) kullanmaya ihtiyacımız olabilir:

Teorem. Eğer $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ ve

$$a_0 + a_1\pi + a_2\pi^2 + \dots + a_n\pi^n = 0$$

ise, o zaman $a_0 = a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ 'dır.

1. Çıkarma altında kapalı olan bir reel sayılar kümesinin toplama altında da kapalı olduğunu gösterin.

Kanıt: Sonuç, $x + y = x - ((x - x) - y)$ eşitliğinden çıkar.

2. Çıkarma ve kare alma altında kapalı olan ve her ögesinin yarısını da içeren bir gerçel sayılar kümesinin çarpma altında da kapalı olduğunu gösterin.

Kanıt: $xy = \frac{(x+y)^2 - x^2 - y^2}{2}$ eşitliğinden ve bir önceki sorudan hemen çıkar.

3. Çıkarma ve kare alma altında kapalı olan ve $1/2$ 'yi de içeren bir gerçel sayılar kümesinin çarpma altında da kapalı olduğunu gösterin.

Kanıt: $1/2$ kümede olduğundan, karesi $1/4$ de kümede. Ayrıca aşağıdaki eşitliğe dikkatinizi çekelimiz:

$$x/2 = (x + 1/4)^2 - x^2 - (1/4)^2.$$

Demek ki küme ikiye bölme altında kapalı. Şimdi ikinci sorudan istediğimiz çıkar.

4. Çıkarma ve kare alma altında kapalı olan ama çarpma altında kapalı olmayan bir gerçel sayı kümesi bulun.

Yanıtlardan biri: $A = \{a_1\pi + a_2\pi^2 + 2a_3\pi^3 + a_4\pi^4 + \dots + a_n\pi^n : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, a_i \in \mathbb{Z}\}$ olsun. A 'nın

çıkarma ve kare alma altında kapalı olduğunu görmek oldukça kolay. Ama $\pi, \pi^2 \in A$ ve $\pi\pi^2 = \pi^3 \notin A$. (π^3 sayısının A 'da olmadığı başta verilen teoremden çıkar.)

5. Çıkarma ve tersini alma altında kapalı olan ve $1/2$ 'yi içeren bir gerçel sayılar kümesinin çarpma altında da kapalı olduğunu gösterin.

Kanıt: Önce $1/2 + 1/2 = 1$ 'in kümede olduğuna dikkatinizi çekeriz. Şimdi

$$((y - (1 + y^{-1})^{-1})^{-1} - y^{-1})^{-1} = y^2$$

eşitliğini ve üçüncü soruyu kullanın.

6. Çıkarma ve kare alma altında kapalı olan bir kesirli sayı kümesinin çarpma altında da kapalı olduğunu gösterin.

Yanıt: A , çıkarma ve kare alma altında kapalı olan bir kesirli sayılar kümesi olsun. $u, v \in A$ olsun. $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ için $u = a/b$ ve $v = c/d$ olsun. Ve e, ad ve bc sayılarının en büyük ortak böleni olsun. Şimdi

$$u = a/b = (e/bd)(ad/e) \in (e/bd)\mathbb{Z}$$

ve

$$v = c/d = (e/bd)(bce) \in (e/bd)\mathbb{Z}.$$

Demek ki $uv \in (e^2/b^2d^2)\mathbb{Z}$. Dolayısıyla uv sayısının A 'da olduğunu kanıtlamak için, e^2/b^2d^2 sayısının A 'da olduğunu kanıtlamalıyız. Bunun için de e/bd sayısının A 'da olduğunu göstermek yeterli. $e = \text{ebob}(ad, bc)$ olduğundan, öyle x ve y tamsayıları vardır ki $adx + bcy = e$. Demek ki

$e/bd = (adx + bcy)/bd = (a/b)x + (c/d)y = ux + vy$ ve bu son sayı da A 'dadır. Demek ki $e/bd \in A$ 'da.

7. $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ ($ya da \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$) kümesinin bir altkümesi çıkarma ve kare alma altında kapalıysa çarpma altında da kapalı mıdır?

Yanıt: Bu sorunun yanıtını yarışmadan önce biz de bilmiyorduk. Yarışmadan sonra yanıtın $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ için olumlu olduğunu lise düzeyini aşan bir soyut cebir bilgisi kullanarak kanıtladık. Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Serhat Doğan $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ için yanıtın olumlu olduğunu lise düzeyinde bir kanıtla gösterdi. Böylece soru $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ için de lise düzeyinde yanıtlanmış oldu. Bundan sonraki yazıda Serhat Doğan'ın kanıtını bulacaksınız. ♥